


Återkommande

- 3594** Lediga tjänster
3596 Platsannonser
3614 Meddelanden
3616 Inlägg utifrån
 När man inte känner igen folk man känner Ludvig Rasmussen
 Medicinhistorisk minipaus (**3571**)

I nästa nummer

Kinoloner – bot som blivit hot

Accelererande resistensutveckling kräver skärpta indikationer.



www.lakartidningen.se

FÖRHANDSPUBLICERAT

Antivirala läkemedel – aktuella behandlingsråd

Ingrid Uhnoo, Annika Linde

Influensaläkemedel kan inte ersätta vaccination, som är hörnstenen i preventionsstrategin mot influensa. För att mildra sjukdomsförloppet är läkemedlen ett bra tillägg, och som profylax ger de god skyddseffekt. Målgrupper för både behandling och profylax är medicinska riskgrupper.

Influensa, fåglar och pandemihot

Anders Lindberg, Anders Tegnell

Att en pandemi närmar sig är otvetydigt, men tidtabellen är högst osäker. Hela samhället bör förbereda sig på den extrema situation som en pandemi innebär. Socialstyrelsens beredskapsplan inför en pandemi presenteras, och förvirringen kring begreppen influensa, fågelinfluensa och pandemi reds ut.

Flyktingpolitiken behöver reformeras

Solvig Ekblad, Hans Peter Söndergaard

Snabb tillgång till samma rättigheter som bofasta gynnar flyktingars psykiska hälsa, även på lång sikt. Ansvariga för EUs hälsopolicy bör därför garantera att asylsökande får sjukvård som är jämförbar med de bofastas. Att begränsa tillgången till endast akut vård för livshotande sjukdomstillstånd kan leda till kronifiering av annars reversibla sjukdomstillstånd. Detta har knappast beaktats i det svenska förslaget till lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande.

Asylprocess grogrund för apati hos vissa barn

Göran Bodegård (MK), Lars Joelsson, Karin Dahlin (KV)

En retrospektiv studie från Boden/Luleå av asylsökande barn som sökt barnpsykiatrisk behandling visar att negativt besked om uppehållstillstånd ofta var utlösande faktor för symtom. Eftersom sammanställningen bygger på ett oselektat material av barn som sökt till en PBU-mottagning från en och samma flyktingförläggning, har det varit möjligt att (till skillnad från andra sammanställningar) följa prevalensen av sjuklighet och hur asylprocessen påverkat barnens hälsa. Sedan 2000 har antalet asylsökande familjer som söker PBU ökat, och fler barn har behövt hjälp med näringstillförsel – av dessa barn hade nästan hälften gjort självmordsförsök.

Diabetes kan förebyggas/hållas i schack med balanserad kost

Björn Vessby

Läkemedelsindustrin satsar enormt på mediciner mot livsstilsrelaterad ohälsa – till ökande kostnader, vilket är ett hotande samhällsekonomiskt problem. Men bestående livsstilsförändringar behövs! Det gäller såväl patienter med diabetes som den övriga befolkningen, som blir allt tjockare med åtföljande risk för följdsjukdomar, där diabetes bara är en av dessa. De nya, evidensbaserade kostråden för att förebygga och behandla diabetes är här en bra bas.

Ibland fel vaccin till doktors egna barn

II Vaccinationer är kanske den enskilda åtgärd som betytt mest för att befrämja hälsa hos världens barn. Detta till trots motarbetas barnvaccination av grupper som ideologiskt står nära alternativmedicinen och vissa miljöförörelser. Ett av argumenten är att genomgången sjukdom är mer »naturligt« skydd än immunisering.



Josef Milerad

medicinsk chefredaktör

Att sådana idéer även påverkar läkares beslut att vaccinera sina egna barn framgår av en schweizisk studie, publicerad i den amerikanska barnläkarföreningens tidskrift *Pediatrics* (2005;116:623-33). Schweiz har ett kostnadsfritt vaccinationsprogram snarlikt det svenska. I landet finns också en stark tradition av homeopati och alternativmedicin.

Studien utgjordes av en webbenkät till 1 017 läkare om attityder samt hur man hade vaccinerat eller avsåg att vaccinera sina egna barn. Man jämförde svaren från dem som var barnläkare, och förväntades aktivt stödja vaccinationsprogrammet, med svaren från läkare med andra specialiteter. 93 procent av samtliga tillfrågade följde rekommendationerna – fler än genomsnittet i landet, men en lägre siffra än på svensk BVC! Barnläkarna följde vaccinationsprogrammet bäst, utom att man ofta gav vacciner som rekommenderas bara för riskgrupper: hepatit A, pneumokock- och meningokockvaccin. Tio procent av icke-barnläkare avvek från rekommendationerna. Vanligast var att vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta uppsköts eller att mässling-, pertussis- och rubellavaccin valdes bort.

Det som författarna oroades mest av var att de uppgivna skälen baserade sig mer på obevisade uppgifter från medier och aktivistgrupper än på fakta. Läkare tar med andra ord intryck av allmänna opinioner även om dessa går emot välgrundade rekommendationer.

josef.milerad@lakartidningen.se